

UNITE TO  
→ END  
TB

結核觀點

# 結核病不用怕



1993年世界衛生組織訂定每年的3月24日為「世界結核病日」提倡結核病防治的重要性。

至今，全球仍有 1 / 3 的人口已被肺結核感染，每年仍有 150 萬人死於結核核病相關的問題。

在台灣，平均每小時診斷出一位結核病患者，為了終結結核病，政府積極篩檢可能的感染者，並給予治療，期許台灣未來能終止結核病的發生。

# 潛伏結核感染 = 結核病嗎？



## 潛伏結核感染

## 結核病


	潛伏結核感染	結核病
症狀	無	咳嗽、胸痛、體重減輕、倦怠、食慾不振、發燒、咳血等
傳染力	不具傳染力，但終生有5%-10%機會發病成結核病	飛沫與空氣傳染，通常會傳染與病患同住一室的家人或親近接觸的人
治療方式	由醫師依個案情形選擇以下其中一種處方 <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 速克伏：每周服用一次，共12次（約3個月）</li> <li>◆ isoniazid (INH)：每日服用一次，持續9個月。</li> </ul>	每天服藥，持續6到9個月。
治癒副作用	較少	較多



## 結核觀點-2

# 誰可能成為潛伏結核感染者？

與具有高傳染力結核病患同住的家人或密切接觸者，容易成為潛伏結核感染者 即日起，如民眾過去曾與結核病患者接觸且未曾接受檢查者，衛生所會通知接受檢查及診斷評估





## 結核觀點 - 3

# 潛伏結核感染的發現到治療

高傳染性  
結核病接觸者

**結核菌素測驗**  
手臂內側皮內注射  
(五歲以下接觸者)

衛生所  
評估後通知

民眾攜轉介單  
前往合約院所  
或衛生所篩檢

抽血  
檢驗  
報告

**IGRA檢查**  
抽血的方式進行檢驗  
(五歲(含)以上接觸者)

