

## 日本腦炎 Q&A

**Q：甚麼是日本腦炎？**

A：是一種日本腦炎病毒感染所引起的急性腦膜腦炎，三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊是傳染媒介。

**Q：日本腦炎如何傳染給人？**

A：根據研究資料，日本腦炎病毒在豬隻身上繁殖，經由病媒蚊叮咬豬隻後，再叮咬人體造成感染；人被帶有病毒的蚊子叮咬後會造成腦部、脊髓及腦膜受損。

**Q：日本腦炎流行的季節？**

A：流行季節主要集中於每年 5 至 10 月，亦即春末夏季之時，高峰期是 6 至 7 月。

**Q：感染日本腦炎的症狀以及嚴重程度？**

A：患者大部分為無症狀感染，少數人會有發燒、頭痛或嘔吐等腦膜炎症狀，有些人則伴隨意識改變、抽搐、肢體麻痺或性格異常等症狀。其致死率約為 5~60%，存活個案常有嚴重的神經性或精神性後遺症，對健康造成極大危害。

**Q：要如何預防？**

A：防治日本腦炎最有效的方法之一，是施打疫苗，家裡有年滿 1 歲 3 個月的小寶貝如尚未接種日本腦炎疫苗，請儘速帶往合約醫療院所接種。

**Q：避免日本腦炎上身的方法？**

A：1、居家環境管理：疏通水溝、清除雜草、處理積水及家中需設置紗門、紗窗，以消滅病媒蚊及其幼蟲。

2、病媒蚊常於傍晚出沒，請於需外出於雜草叢生處或積水地區之前，應做好防蚊準備；穿上長袖長褲必要時噴上衛生福利部核可之防蚊藥劑，以避免病媒蚊叮咬。

3、日本腦炎疫苗接種：請按時帶家中出生滿十五個月的幼兒接種第一劑疫苗，間隔二週再接種第二劑疫苗，隔年還需要再接種第三劑疫苗，別忘記滿 5 歲時還要追加一劑。完整接種四劑日本腦炎疫苗後，面對日本腦炎病毒就多了一層保護力。

\*台灣自民國 57 年起，新生兒全面施打日本腦炎疫苗，之前出生的人多半都沒有接種過疫苗。據統計，日本腦炎在成年及幼童皆有

機會發生。注射日本腦炎需先經醫師看診評估，若是孕婦、感冒發燒、曾對疫苗過敏或不良反應等情形者，則不適合接種。

相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢 (<http://www.cdc.gov.tw>)  
或撥打國內免付費防疫專線 1922 (或屏東縣政府衛生局防疫專線  
08-7388999) 洽詢。