

潛伏結核感染(LTBI)的 12 個劑量療程-速克伏短程治療處方用藥須知

您已經被診斷出潛伏結核感染

您已經被檢驗出體內有結核菌但還沒有發病，目前不會傳染他人；但如果沒有接受治療，一旦自身免疫力降低時，就可能發病而且傳染給他人。

接受潛伏結核感染治療可以消滅您體內的結核菌，預防未來發病，是您最好的選擇。

什麼是「速克伏」短程治療處方？

「速克伏」短程治療處方(下稱速克伏)指的是---您每週服用一次 rifapentine 和 isoniazid 二種藥物，共服藥 12 週就可以完成治療的一種短程療法。

未滿 2 歲的兒童、懷孕婦女或計畫於治療期間懷孕的婦女，建議使用其他處方。

使用「速克伏」短程治療處方要配合甚麼？

「速克伏」是由疾病管制署特別以專案進口方式引進國內，並以公費提供的藥物，所以必須由衛生單位關懷員送藥並親眼目視服藥。您從醫院領藥回家後，先不要自行服用，請主動與開立接觸者檢查轉介單給您之衛生單位聯繫，衛生所關懷員會收回藥物並與您討論排定後續服藥時間。每次送藥時會觀察您服藥後是否有不舒服，以確保您安全的完成治療。

若您有服用任何其他藥物(包括避孕藥)，應告訴您的醫師。Isoniazid 和 rifapentine 可能會對多種藥物造成干擾，因此讓您的醫師知道您正在服用的藥物是很重要的。若您因其他疾病同時服用藥物，請務必告知該醫師，您正在接受速克伏短程治療處方。



保護您的家人及朋友免於感
染結核病 - 您應完成潛伏
結核感染治療療程！

**「速克伏」處方藥物
為疾病管制署公費提
供，故必須接受衛生
單位的「都治」送藥
管理。**

服用速克伏的注意事項

服藥

服藥前可先吃些東西再服藥，以利藥物吸收。

飲酒

服用本處方期間，每日飲酒會增加肝臟受損的風險，建議治療期間不要飲酒。

女性

- 本處方會干擾荷爾蒙避孕法(包括避孕丸、避孕環及針劑)。治療期間建議使用保險套或子宮內避孕器等方式避孕。
- 若您已經懷孕或疑似懷孕，請立刻通知您的醫師或公衛護士。

其他問題

Rifapentine 可能會使您的尿液、唾液、眼淚或汗水變成橘紅色，這是正常現象，為了避免在治療期間被永久染色：

- 請勿配戴非日拋隱形眼鏡。
- 若您有配戴假牙，儘可能在不需要使用時把假牙取出。

可能的副作用

部分服藥者可能會有下列不舒服，通常程度不會影響日常生活。但若有發生請立即與都治關懷員連繫，讓公衛護士即醫師協助您。

- ◇ 頭暈、頭痛
- ◇ 食慾不佳，或沒有食慾
- ◇ 胃不舒服、噁心或嘔吐
- ◇ 肌肉痠痛
- ◇ 無力、疲倦
- ◇ 發燒或畏寒
- ◇ 皮膚或眼白變黃
- ◇ 皮疹或搔癢
- ◇ 呼吸急促
- ◇ 臉紅及寒顫
- ◇ 手腳刺痛或麻木

若您出現急性過敏反應，請立即回到原就診醫院並與您的醫師聯絡；如果對於治療潛伏結核感染有任何疑問，亦請諮詢您的醫師或撥打 1922。