

## 毒蛇咬傷與蛇毒血清 Q&A

**Q：臺灣地區常見重要性毒蛇有幾種？毒性？**

**A：常見的毒蛇共有 6 種包括：**

1. 雨傘節：神經性毒蛇。
2. 眼鏡蛇：神經性毒蛇。
3. 百步蛇：出血性毒。
4. 青竹絲：屬出血性毒，俗名赤尾鮎。
5. 龜殼花：出血性毒。
6. 鎖鍊蛇：出血及神經毒。

**Q：如何預防毒蛇咬傷？**

- A：**
- 1、儘量不去草叢及灌木叢，特別在 4 到 10 月天氣暖和的時候。必要時穿高筒鞋、寬鬆褲子及戴手套，以防蛇咬傷。清理住家附近蛇可能藏匿的地方，以防孩童玩耍時被咬傷。
  - 2、不要隨便進入竹林或矮樹林中，若要進入，最好隨身帶帽子及棍棒，撥弄枝葉，切忌使用手以撥開枝葉，容易被青竹絲所咬傷。記得台灣毒蛇咬傷，以青竹絲最常見。
  - 3、蛇是相當膽小的動物，打草驚蛇，給予它們足夠的脫逃時間，就不會反咬你一口。

- 4、不要隨便撿拾草地上、溪流邊、甘蔗園或樹林下，任何枝狀物或石頭、及其他廢棄物品或花草或翻動石塊，都有可能遭到蛇的攻擊。
- 5、廢棄的房子、洞穴等都容易有蛇居住，不要隨便進入或隨使用手摸索。不要輕易嘗試去抓蛇或玩蛇。
- 6、露營時應選擇空曠乾燥地區，避免紮營於雜物或石堆附近，晚上應升起營火或灑石灰於營帳周圍。

Q：毒蛇咬傷送醫院前該怎麼辦？

- A：1、被蛇咬的人應保持鎮定和靜止活動，不要驚惶失措地奔跑，以減慢蛇毒的吸收。
- 2、旁邊的人可安慰傷者被毒蛇咬傷並無即時生命危險，盡可能辨識是否是被毒蛇咬傷。
  - 3、除去被咬傷肢體之指環、手環及一切可能緊身之衣服或物件。
  - 4、如環境允許，輕微清洗傷口。
  - 5、用寬闊之繃帶或布條包紮傷肢，不要太緊，剛可把兩根指頭插入繃帶與肢體之間即可。
  - 6、固定受傷肢體就如處理骨折般，把傷肢平放在心臟水平。
  - 7、重複檢查傷肢之指頭，以確保血液循環，不會因包紮過緊而受阻。

- 8、傷者應減低活動量；盡快到醫院急症室求診。
- 9、如果蛇已死，可把牠一起帶到急症室，幫助醫生辨認。但千萬不能徒手觸摸死蛇，更不應嘗試打蛇或捉蛇。
- 10、切勿使用一些對蛇傷無用或有害急救方法如：切破傷口、吸吮、結紮、冰敷、電擊、草藥外敷或內服、藥酒等。